

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son Kullanma Tarihi: ("")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve nosu: 13.05.2011 / 8354

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Turunçgiller (Limun, portakal, greyfurt, mandalina)	Turunçgili meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamlanması (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	200 g/100 L su	14 gün
	Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (<i>Phytophthora citrophthora</i>)	300 g/100 L su Meyveler ilağı suya 3 dakika süre daldirilir.	
Armut	Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında aleş yanıklığı (<i>Erwinia amylovora</i>)	400 g/100 L su	14 gün

HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ HASTALIKLI KISIMLAR DEZENFEKTANLA BİTİRİLMİŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.

Hıyar, Kavun	Kabakgillerde mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200 g/100 L su	3 gün
Sogan (Sera)	Sogan mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	150 g/100 L su	14 gün
Sogan (Tarla)	Sogan mildiyö (<i>Peronospora destructor</i>)	75 g/da	14 gün
Domates	Domates mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/100 L su	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıcağa kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**** Dekara uygulamalarda 50 litre su ile kullanılmaktadır.**

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlandıktan sonra makineyi temizleyin. Uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaları yıkayın. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

TRAK VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABİL EDİLMİŞTİR
1702 ZARARLI ORGANİZMALARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN
KABİL EDİLMİŞTİR



SUNSET

POSEIDON® 80 WP

İslenabilir Toz (WP)

Grup	U:33	Fungisit (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

%80 Fosetyl-AI

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulamış sahaya bitki koruma ürünü kuruyuncaya kadar insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

YASAĞDIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adale kasmaları, diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık İfadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurunuz.

İçti: Temas halinde buluşuk elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Yutma: Yutulması durumunda kusturun. Derhal doktora başvurunuz. İlaç etkiler veya ambalajı doktora götürülür. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağzından bir şey verilmemez ve kusturulmaz.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:
Fosetyl-AI

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapışması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310 Her men ZEHİR MERKEZİNİ veya doktorunu/hekimi arayın.

P501 İçerdiği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Rev.2

TRAK VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABİL EDİLMİŞTİR
1702 ZARARLI ORGANİZMALARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN
KABİL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

POSEİDON® 80 WP bitki özsuyununda yaprakkan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungisittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuyna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:

*Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.
2. Uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enteleli ağaçlardaki yataylar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü: Meyveler karışma 3 dakika süre ile daldırılır.

Armut aleş yanıklığı: Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte 1'er uygulama. Hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir 3. uygulama gerekebilir.

Hıyar, Kavunda yalancı mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

Soğan mildiyösi: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüncce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyösi: Uygulamaya çevredeki domates yapılarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **POSEİDON® 80 WP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **POSEİDON®80 WP**'nin aynı üretilen sezonun içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:33 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Yaprak gübrelere, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürününün yapraklara nüfuzunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından, karışım yaparken yağın uygulamadan önce küçük çapta denemeler yapılması önerilir.



SUNSET

POSEİDON® 80 WP

Islanabilir Toz (WP)

Grup	U:33	Fungisit (Mantar ilacı)
------	------	-------------------------

%80 Fosetyl-AI

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Airlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- **POSEİDON® 80 WP** hızlı nem geçici olduğundan topraklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT. İML. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B Nolu Yol Cad.
Fnc Tarm Blok No:6 Bor/İĞDE
Tel: (0388) 999 16 06
Fax: (0388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sok.
No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax: (0 262) 751 14 22



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
08 Temmuz 2021
KAYITLI BELGİDİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
KAYITLI BELGİDİR.
Rev. 2