

İmal Tarihi:  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarih ve No.su: 20.06.2013/9263

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği ( <i>Panonychus ulmi</i> )	37,5 g/100 l su	7 gün
	Akdiken akan ( <i>Tetranychus viennensis</i> )	30 g/100 l su	
Armut	Armut psillidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	100 g/100 l su	7 gün
Fasulye	Pamuk kırmızıörümceği ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )	75 g/100 l su	7 gün
Bağ *	İki noktali kırmızıörümcek ( <i>Tetranychusurticae</i> )	50 g/100 l su	7 gün
Çilek	Pamuk kırmızıörümceği ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )	60 g/100 l su	7 gün
Pamuk	Kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychusspp.</i> )	60 g/da	7 gün
Domates	Kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychusspp.</i> )	75 g/da	3 gün
Gül	Pamuk kırmızıörümceği ( <i>Tetranychuscinnabarinus</i> )	60 g/100 l su	7 gün
Karanfil	Kırmızı örümcekler ( <i>Tetranychusspp.</i> )	60 g/100 l su	7 gün

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atılan su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Temas ve mide yoluyla etkili, aynı zamanda translamınar özelliğe sahip bir akaristittir. Kırmızı örümceklerin larva, nimf ve erginlerini kontrol eder.

**Elma - Avrupa kırmızıörümceği ve Akdiken akarı:** Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Armut - Armut psillidi:** Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamını açılıp, 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15'ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

**Fasulye - Pamuk kırmızıörümceği:** Fasulyede yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

SUNSET  
**YAKUZA 20 WP**

Islanabilir Toz (WP)

Grubu	21A	İnsektisit + Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	-----	--

% 20 Tebufenpyrad

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunması halinde** maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa ambulans çağırın ve mümkünse suni teneffüs yaptırın. Derhal tıbbi yardım alın.

**Deri ile teması halinde** kirli kıyafetleri çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol miktarda su ile yıkayın. Sonrasında bol su ve sabun ile yıkayın ve kurutun, tahriş olursa derhal tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde** Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde** en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünü GBF'nu gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hasta baygın değilse ağzını bol miktarda su ile çalkalayıp ve bol miktarda su içirin. Genel durum değerlendirilmesiyapılıp, belirtilere göre tedavi uygulayın.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

10 Kasım 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
MÜHÜR ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tebufenpyrad



**DİKKAT**

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

**H302**-Yutulması halinde zararlıdır.  
**H332**-Solunması halinde zararlıdır.  
**H317**-Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
**H410**-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

**P261**-Tozunu/dumanını solumaktan kaçınınız.  
**P270**-Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin,Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
**P273**-Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
**P280**-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.  
**P391**-İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.  
**EUH401**-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
E ALETLERİ İMALAT PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.  
Organize San. Böl. Mh. 2/B Nolu Yol Cd.  
FNC Tarım Mh. Borç 7 NİĞDE  
Borç 7/1061 7865  
Mersis No: 07840617865

SELAMİ YILDIZ  
GENEL MÜDÜR



**Bağ - İki noktalı kırmızıörümcek:** Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Çilek - Pamuk kırmızıörümceği:**

**Erken dönem uygulaması:** Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çilek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

**Mevsim içi uygulaması:** Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

**Pamuk - Kırmızıörümcekler:** Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Domates - Kırmızıörümcekler:** Domateste yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

**Gül ve karanfil-Kırmızıörümcekler:** Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

**DİRENÇ YÖNETİMİ:**

**YAKUZA 20 WP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir insektisit + akarisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **YAKUZA 20 WP**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

  
SUNSET  
**YAKUZA 20 WP**  
İslenabilir Toz (WP)

Grubu	21A	İnsektisit + Akarisit (Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
-------	-----	--

% 20 Tebufenpyrad

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol  
Cad. FNC Tarım Blok No:6 Bor/NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 999 16 19

**ÜRETİCİ FİRMA:**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.  
No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ  
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax: (0 262) 751 14 22

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cd.  
FNC Tarım Blok No:6 Bor / NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Mersis No: 07840617865

**BELAMİ YILDIZ**  
GENEL MÜDÜR

10 Kasım 2021  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

