

İmal Tarihi:  
Son kullanma tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat tarih ve numarası: 06.01.2015/10010

#### KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Hıyar	Kabakgillerde Mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	40 g/100 L su	3 gün
Domates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/100 L su (sera) 40 g/da (tarla)	3 gün
Domates	Erken yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	40 g/100 L su (sera) 40 g/da (tarla)	3 gün
Bağ*	Mildiyö ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40 g/100 L su	28 gün
Patates	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	40 g/da	14 gün
Karpuz (Tarla)	Alternarya yaprak yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	40 g/da	3 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken bitki koruma ürünü su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde bitki koruma ürünü su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Hıyar Kabakgillerde Mildiyö:** Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

**Domates Mildiyö:** Bitki koruma ürünü mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz küllü örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

SUNSET  
**BURJUVA®**  
Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	27	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	-------	-------------------------

%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone

#### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

#### EVDE KULLANMAYINIZ

#### ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY

#### YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

#### HAYVAN SOKMAYINIZ.

#### İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN

#### KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Göze temas halinde:** 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Deri ile teması halinde:** Kirli elbiseleri çıkarınız. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Yutulması halinde:** Hastayı ve bitki koruma ürün ambalajını derhal doktora gösteriniz. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyiniz ve kusturmaya çalışmayınız.


**Soluması halinde:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırınız. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

\*SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114



Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

#### İÇİNDEKİLER:

Cymoxanil  
Famoxadone

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



#### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.  
H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.  
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.  
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.  
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.  
P273 Çevreye verilmesinden kaçınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına dikkat.

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ MAL. PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi, 2/B No.lu Yol Çiğli  
FNC/İzmir/06100/6 Bor / NİĞDE  
B. No: 784 061 7865  
M. No: 07840617865

SELAMİ YILDIZ  
GENEL MÜDÜR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

13 Eylül 2021

**Domates Erken Yaprak Yanıklığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

**Bağ Mildiyö:** İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'e ulaştınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.

**Patates Mildiyö:** Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

**Karpuzda Alternarya Yaprak Yanıklığı:** Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

**BURJUVA®** bitki koruma ürününün hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün; domates, hıyarda ise 1-2 gün içinde yapılacak uygulama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

**BURJUVA®** farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

**BURJUVA®** uygulamadan 2 saat sonra yağın yağmurlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer uygulamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse bitki koruma ürününün etkisinde azalma olacağından uygulamayı tekrarlamak gerekebilir.

**BURJUVA®** ile sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar ve patatesten 3'ten fazla uygulama yapmayınız.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**BURJUVA®** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27; C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BURJUVA®** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 27; C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **FİTOTOKSİTE:**


**BURJUVA®** tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

#### **KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

13 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



  
SUNSET  
**BURJUVA®**  
Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grup	27	C3:11	Fungisit (Mantar ilacı)
------	----	-------	-------------------------

**%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone**

#### **KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.  
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.  
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.  
- **BURJUVA®** orijinal ve kapalı ambalajında, kuru ve iyi havalandırılan bir depoda, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir yerde depolanmalıdır.  
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

#### **DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol  
Cad .FNC Tarım No:6 Bor/NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89

#### **ÜRETİCİ FİRMA:**

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.  
No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ  
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)  
Fax: (0 262) 751 14 22



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALETLERİ İML. PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cd  
FNC Tarım No:6 Bor / NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Mesaj No: 07840617865

SELAMİ YILDIZ  
GENEL MÜDÜR