

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü





**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ
RUHSAT BELGESİ**

İMAL

Ruhsat No:	10047	Ruhsat Tarihi:	20.01.2015
Ticari Adı		: MOZART 240 EC	
Grubu		: Herbisit	
Aktif Madde ve Oranı		: 240 g/l Oxyfluorfen	
Formülasyon Şekli		: EC (Emülsiyel Olabilen Konsantre)	
Görünüşü		: Kahverenginden Sarıya Değişebilen Sıvı	
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi		: SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B Nolu Yol Cad. Fnc Tarım Blok No:6 Bor / NİĞDE	
Üretici Firmanın Adı ve Adresi		: FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Caddesi No:6 Bor / NİĞDE	
Üretim Tesisinin, Üretim İzin Tarih ve Numarası		: 30.04.2018 / 02-381	
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre		: 20.01.2025 (Yirmi Ocak İki bin yirmibeş) tarihine kadar	
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni		: 23.08.2021, Ruhsat Sahibi Firma Adres Değişikliği	

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi. (")
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no: 20.01.2015/10047

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği	Kırmızı köklü tilikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kara pazı (<i>Atriplex patula</i>)	100 ml/da Çıkış öncesi	21 gün
Soğan	Kokar ot (<i>Bifora radians</i>) Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>)	75 ml/da	21 gün
Karnabahar	Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	150 ml/da	21 gün
Narenciye	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>)	250 ml/da Çıkış öncesi	21 gün
Armut	Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleraceae</i>) Sarmaşık çobandeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Kirpi danı (<i>Setaria spp.</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	250 ml/da Çıkış öncesi	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI:

Tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 L su ile uygulanır.

AYÇİÇEĞİ: Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce.

SOĞAN: İlk üç yapraktan sonra mum tabakası oluştuğundan sonra, otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.

KARNABAHAR: Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.

NARENCİYE VE ARMUT: Yabancı otlar çıkışından önce.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
23 Ağustos 2021

Umutluğur BAHÇE
Daye Başkanı
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SUNSET

MOZART® 240 EC

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	E 14	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayınız.

Cilt: Temas halinde elbiselerinizi çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayınız.

Yutma: Fazla miktarda alınması halinde hastaya 1-2 bardak su içirerek kusmasını sağlayınız. Hastanın bilinci yerinde değilse kusturmayın ve ağızdan başka bir şey vermeyin. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora ilacın etiket bilgileri ile birlikte başvurun.

Solunum: Temiz havaya çıkın. Solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa oksijen verin. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

© SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Oxyfluorfen
Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi su ve sabun ile iyice yıkayınız.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALETLERİ İMALAT VE PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, 2/B No.lu Yol C/1
FNO/İzmir, 35100, 2/B Bor / NİĞDE
Bölge Tel: 784 061 7865
Web: www.sunsetkimya.com.tr

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MOZART® 240 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup E 14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MOZART® 240 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E 14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Herhangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun değildir.



MOZART® 240 EC

Emülsiyon konsantre (EC)

Grubu	E 14	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	------	-----------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zarar veya hastalık ya da böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım Blok No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:6 Bor/NİĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
23 Ağustos 2021

Umur BAĞÇE
Daire Başkan V.



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALETLERİ İMALAT VE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2/B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım Blok No:6 Bor / NİĞDE
Borun No: 784 061 7865
Mersis No: 078406178651000000