



İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay yılı olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yılı olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süresi
Domates	Sebzelerde kurşunu küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Patlicangillerde külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60 g/100 L su	3 gün
Çilek	Kurşunu küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	100 g/100 L su	7 gün
Kiraz,	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	75 g/100 L su	7 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	100 g/da	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamadan tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

VECHTOR WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	C2:7	C13:11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	--------	----------------------------

% 26.7 Boscalid + % 6.7 Pyraclostrobin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik görülür.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa ambulans çağırın ve mümkünse suni teneffüs yaptırın. Derhal tıbbi yardım alın.

Deri ile temas halinde kirlili kıyafetleri çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol miktarda su ile yıkayın. Sonrasında bol su ve sabun ile yıkayın ve kurulaştırın, tahriş olursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünün GBF'ni gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hasta baygın değilse ağzını bol miktarda su ile çalkalattın ve bol miktarda su içirin. Genel durum değerlendirilmezse yapıp, belirtilere göre tedavi uygulayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 0312 414 1014

06 2003

TAPIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

U. S.

Net miktarı: (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Pyraclostrobin, Boscalid, Alkil Aril Sülfonat Kalsiyum Turzu

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319-Ciddi göz tahrişine yol açar.

H411-Suçul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273-Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P501-İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına boşaltılmayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Boş ürün ambalajını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

Ali Arman
KABAKÇI
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
ve ALT. İM. PAZ. SAN. VE İC. LTD.ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Toros Cad. No : 11 Sarıcamı/ADANA
Tel.: 0322 394 51 73 - 72 Fax : 0322 394 51 73
YÜREGİK NO: 784 028 7284



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) Külleme: hastalıkla etkin bir kimyasal mücadele yapmak için gözler açılmadan ya da açılmak üzere iken bir-ilk uygulama önerilmektedir. Daha sonra hastalığın bahçede çıkma durumuna göre birer hafta uygulama yapılabilir. Uygulama altı kez tekrarlanabilir ya da daha önce belirtildiği gibi hastalık çıkış gösteriyorsa uygulamaya devam edilir. Genellikle hastalık meyveleri (bazı çeşitler hariç) etkilemez. Bu yüzden meyveler fındık büyüklüğüne gelince uygulamaya devam edilebilir. Ağustos aylarında süngümler tekrar gelişmeye başlayınca da uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Biber (Sera) Külleme: Uygulamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates-1 -Biber): Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.

Çilek Kurşuni Küf:

- 1.uygulama: İlk çiçeklerin %10'u açınca,
- 2.uygulama: Çiçeklerin %50'si açınca,
- 3.uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (, Kiraz, Kayısı):

- 1.uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
- 2.uygulama: tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Kimyasal uygulama yeşil aksam uygulamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır.

Karpuzda Alternaria yaprak yanıklığı: Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün (her aktife göre değişiyor) aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Patates Erken yaprak yanıklığı: Hastalığın seyrine, iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

VECHTOR WG adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup C2:7, C13:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **VECHTOR WG** nun aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip (GrupC2:7, C13:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIBİLİRLİK DURUM:


Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilemez. Karışım yapılacaksa, karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.

11.9

06 Ağustos 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR


Dr. Yunus BAYRAKTAR
Genel Müdür Yardımcısı V.



VECHTOR WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	C2:7	C13:11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	--------	----------------------------

% 26.7 Boscalid + % 6.7 Pyraclostrobin

DEPOLAMA DURUMU:


Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olabilecek zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No.11 Sarıçam/ADANA
Tel:0322 3945171-72 Fax: 0322 3945173


SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALTI. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Toros Cad. No : 11 - Sarıçam/ADANA
Tel.: 0322 394 51 71 - 72 Fax : 0322 394 51 73
YÜRESİR V.D. 784 028 7284