

UYGULAMA TAMAMLANMASINDAN HEMEN SONRA UYGULAMA MAKİNESİNİN DEPOSUNU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BOŞALTINIZ. DEPOYA TEMİZ SU DOLDURDUKTAN SONRA KARŞIYICI VE PÜSKÜLTME SİSTEMİNİ GELİŞTİRİLEREK TÜM PARÇALARIN YIKILMASINI SAĞLAYINIZ. YIKILMA İŞLEMİNİ SU KAYNAKLARININ YAKININDA YAPMAYINIZ. YIKILMA SUYUNU VE AKIKARI SU KAYNAKLARINA DOĞALTMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta %50 bulasık hıde, tarla döneminde ise 1 yapraklı ortalam 25 yapraklı bit saplandıgında haşlı mücadele yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yapraklıtine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulasık hıde, tarla + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Pamuk yapraklıtine karşı sürveyler 50 dahik pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısımdan alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pırceleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda 10 adet yapraklıtine sayılır.

Armut psilidine karşı kışlayan döl erginlerinin brraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nihiler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15'den fazlasında bulasık görülduğunda uygulama yapılır.

Şeftalide sefali yaprakpsilidine karşı 50 ağaçta 7 bulasık dal olduğu zaman kimyasal mücadele yapılır.

Ehna yeşil yapraklıtine karşı vefetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulasık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Tiftinde yeşil yapraklıtine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf + ergin görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Tiftinde sefali yapraklıtine karşı yaprak başına ortalama 5 tütün tripsi görüldüğünde uygulamaya yapılır.

Domateste tütün tripsine karşı yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulamaya yapılır. Bunuñta birliktelik parazit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalarını detaylı dikkate alınmalıdır.

Domateste tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulasık olduğu saptanan alan köşgenler yönünden girilir. Her bec adında bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır.

Antepfisiğli psilidine karşı hafiflik olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğunda ve ilk ergin parazitli çikisi ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (Humajin) olmadan önce uygulamaya yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C'ye ulaştığında tarlaya köşgenleri rastlamasında o tarlanın bulasık olduğunu gösterir. Birinci döl ergini arandı. Herhangi bir dönemde ilk dölün (dörtüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döl ergininde de böcek yoğunluğu durumunda ise yumurtla ağınlının tamamlanması beklenmemelidir. Bu dönemde de böcek uygulamaya yapılması bağı olarak meyveye gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebilmeyen uygulamaya gerekilmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan arastırmalar sonucunda patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilmekte ve türünde azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

ginterek 3-5 adında bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Bakagillerde 25-50' parlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda, bir yaprağta düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUNPLUS 350 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin etkilerinden yararlanamaz. SUNPLUS 350 SC ayı üçüncü sezonun içerisinde öncelikle toplanam uygulanamaz. Uygulanamamı tekarrüfisi gerçekleştirildiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A hariç) bitki koruma ürünlerini kullanılmamasına özen gösteriniz.

KARISILABİLİRLİK DURUMU: Yüksek dereceli alkalik ilaçlarla karıştırılmaz. Kullanmadan önce bu karışım testi yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

UYGULAMA TAMAMLANMASINDAN HEMEN SONRA UYGULAMA MAKİNESİNİN DEPOSUNU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BOŞALTINIZ. DEPOYA TEMİZ SU DOLDURDUKTAN SONRA KARŞIYICI VE PÜSKÜLTME SİSTEMİNİ GELİŞTİRİLEREK TÜM PARÇALARIN YIKILMASINI SAĞLAYINIZ. YIKILMA İŞLEMİNİ SU KAYNAKLARININ YAKININDA YAPMAYINIZ. YIKILMA SUYUNU VE AKIKARI SU KAYNAKLARINA DOĞALTMAYINIZ.

UYGULAMA TAMAMLANMASINDAN HEMEN SONRA UYGULAMA MAKİNESİNİN DEPOSUNU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BOŞALTINIZ. DEPOYA TEMİZ SU DOLDURDUKTAN SONRA KARŞIYICI VE PÜSKÜLTME SİSTEMİNİ GELİŞTİRİLEREK TÜM PARÇALARIN YIKILMASINI SAĞLAYINIZ. YIKILMA İŞLEMİNİ SU KAYNAKLARININ YAKININDA YAPMAYINIZ. YIKILMA SUYUNU VE AKIKARI SU KAYNAKLARINA DOĞALTMAYINIZ.

UYGULAMA TAMAMLANMASINDAN HEMEN SONRA UYGULAMA MAKİNESİNİN DEPOSUNU GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BOŞALTINIZ. DEPOYA TEMİZ SU DOLDURDUKTAN SONRA KARŞIYICI VE PÜSKÜLTME SİSTEMİNİ GELİŞTİRİLEREK TÜM PARÇALARIN YIKILMASINI SAĞLAYINIZ. YIKILMA İŞLEMİNİ SU KAYNAKLARININ YAKININDA YAPMAYINIZ. YIKILMA SUYUNU VE AKIKARI SU KAYNAKLARINA DOĞALTMAYINIZ.



SUNPLUS 350 SC

Süspanسیون Konsantre (SC)

GRUBU 4A İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

350 g/L İmidacloprid

17 Kasım 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
KABUL EDİLMİŞTİR.
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- ### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanılmamalıdır.
 - Bahçelere zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınılmalıdır.
 - Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak imha ediniz.
 - Bosalan ambalajları usulüne göre imha ediniz.
 - Bosalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklik görülmez. Sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜN VE ALAT. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Torus Cad. No:11 Sarıçam/ADANA
Tel:0322 3945171/72 Fax: 0322 3945173

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
SUNSET İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi
No: 11 - Sarıçam/ADANA
Torus Cad. No:11 Sarıçam/ADANA
Tel:0322 3945171/72 Fax: 0322 3945173
Yapı V.D. 784 028 7284

