

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü




**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ
RUHSAT BELGESİ**

İMAL

Ruhsat No:	9584	Ruhsat Tarihi:	01.04.2014
Ticari Adı		: RANEB 5 SG	
Grubu		: İnsektisit	
Aktif Madde ve Oranı		: %5 Emamectin benzoate	
Formülasyon Şekli		: SG (Suda Çözünen Granül)	
Görünüşü		: Krem Renkli Granül	
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi		: SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B Nolu Yol Cad. Fnc Tarım Blok No:6 Bor / NİĞDE	
Üretici Firmanın Adı ve Adresi		: HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 700. Sokak No:711/1 Gebze / KOCAELİ	
Üretim Tesisinin, Üretim İzin Tarih ve Numarası		: 24.05.2013/13-295	
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre		: 01.04.2024 (Bir Nisan İkibinyirmidört) tarihine kadar	
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni		: 11.08.2021, Ruhsat Sahibi Firma Adres Değişikliği	

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür V.

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Sarıf No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 01.04.2014/9584

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera litoralis) Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	30 g/da Larva	7 gün
Biber (Tarla)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera litoralis)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Domates (Sera)	Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Domates (Tarla)	Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Bağ*	Salkım güvesi (Lobesia botrana)	25 g/100 L su Larva	7 gün
Hiyar (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera litoralis)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Patlıcan (Sera)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera litoralis)	30 g/100 L su Larva	7 gün
Pamuk	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera litoralis) Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	35 g/da Larva 40 g/da Larva	7 gün 21 gün
Karanfil (Kesme karanfil)	Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera litoralis) Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)	30 g/100 L su Larva	-
Zeytin	Zeytin fidanritli (Palpita unioralis)	30 g/100 L su Larva	14 gün
Nar	Harnup güvesi (Ectomyeicis ceratoniae)	30 g/100 L su Larva	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı ayrı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



RANEB® 5 SG

Suda Çözünbilir Granül (SG)

Grup	6	Insektisit (Böcek ilacı)
------	---	--------------------------

%5 Emamectin benzoate

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI SIFASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEZİNİZ. İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri, göz, burun ve boğazda tahriş yapabilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açırken bol su ile yıkayın. Gerekirse doktora başvurun.

Gilt: Temas halinde bulaşık elbiselerinizi çıkarın. Bitki koruma ürünü degen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Tahriş ve hassasiyet durumunda doktora başvurun.

Yutma: Yutulması halinde bilinci açıkla hastayı kusturun. Derhal doktora başvurun. Ürün etiket ve ambalajını doktora götürün. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmeyi ve kusturulmaz.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

©SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALTILM.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

Net Miktarı (kg veya lt)
Brüt ağırlık (kg)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

İÇİNDEKİLER:

Emamectin benzoate

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DIKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P501 İçerdiği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanıma talimatlarına aydın.

©SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALTILM.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

SELAMİ YILDIZ
GENEL MÜDÜR

Dr. Y. Y. Y.



11 Ağustos 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Biber (sera-tarla), hıyar (sera) ve patlıcan (sera)-Pamuk yaprakkurdu: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera-tarla) ve biber (sera)-Yeşilkurt: Larvalar meyveye giriş yapmadan, 100 bitkiden 5 tanesinin buluşık olması halinde hemen uygulamaya başlanır.

Bağ-Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Egsysel çekiçi tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşip düşmeye başlaması, birinci döde akşamüstü sıcaklıkların iki gün üst üste 15°C'yi aşması ve süreklilik göstermesi, eklii sıcaklıkların toplamının 1. döde 120 gd (gün derece), 2. döde 520 (gd), 3. döde 1047 gd'ye ulaşması, aşmanın fenolojik olarak 1. döde çiçek tomurcuğu, 2. döde koruk, 3. döde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek uygulama yapılır. Her döde bir uygulama yapılır. Ancak 3. döden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ürünün ekli süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak uygulamalara devam edilir.

Pamuk-Pamuk yaprakkurdu: Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi ekli için yumurtaların açıldığı dönemde uygulama yapılması uygundur. Zararlıların dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarda uygulama/tekrarlanmalıdır.

Pamuk-Yeşilkurt: Pamukta yeşilkurtu karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 ml'lik sıra uzunluğunda ortalamaya 2 larva bulunduğuunda uygulamaya karar verilir.

Karanfil-Pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğuunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alılabilmek için, uygulama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İlerki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınmaz.

Karanfil-Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin buluşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

Zeytin-Zeytin fidanturtlu: Birinci ve ikinci dönem larvaların yoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuğundan sonra uygulama başlanır.

Nar harnupgüvesine karşı: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm. çapına geldiğinde, buluşıklık oranı da % 5'in üzerinde ise bitki koruma ürününün ekli süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RANEB® 5 SG adlı bitki koruma ürünü, ekli mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı ekli mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **RANEB® 5 SG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı ekli mekanizmasına sahip (Grup 6 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİMLİLİK DURUMU:

Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



RANEB® 5 SG

Suda Çözünelir Granül (SG)

Grup	6	Insektisit (Böcek ilacı)
------	---	--------------------------

%5 Emamectin benzoate



11 Ağustos 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABİL EDİLİ MİTTİR

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklarına zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Faydalılar uygulamadan 48 saat sonra salımlıdır. Boşalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçların hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1
41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262 751 14 22



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE TİC.A.Ş.
E AĞETLERİ
Organize Sanayi Bölgesi
FNC Tarım No:6 Bor/NIĞDE
Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Mesaj No: 07840617865

ŞELAMİ YILDIZ
GENEL MÜDÜR