

KULLAN IRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanını kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitti koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitti koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitti koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım Blok No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.
No:71/1 41400 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat)
Fax: (0 262) 751 14 22

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
FNC Tarım Blok No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 999 16 19

5 YIL YERLİ ÜRETİM



HARVEST® 25 WP

SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Grup	G1:3	Fungisit (Mantar ilacı)
%25 Tebuconazole		

BİTTİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Demates erken yaprak yanıklığı: Gerek fideликte gerekse tarhada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyri ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma kullenmesi:
1. uygulama: Fembe çiçek tomurcuğu döneminde
2. uygulama: Çiçek taç yaprakların %60-70'i döktüğünde
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitti koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. uygulama: Fembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktükünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün araya yapılmalıdır.

Armut:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döktükünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile uygulanır.

Sert getirdelik meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

2. uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Buğday sarı pas: sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtilen her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 oranılı nem ve 15-20°C sıcaklık) hastalığı seyri izlenmeli, hastalığın bittinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçmasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum oluştuğu varsayarsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kin döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bittinin üst kısmına doğru tirmanan bir enteksiyon için bayrak yaprağının kıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıkça ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Narda phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü:

Uygulama konuculara dikkate birlikte yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ilk belirtiler görüldüğünde uygulamalara başlanılır ve hızlı sürgün gelişim döneminde (ilkbahar, yaz, sonbahar) devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HARVEST® 25 WP adlı bitti koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitti koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **HARVEST® 25 WP**'nin aynı üretim sezonunda gerçekleştirilen toplam uygulama sayısını aşmayız. Uygulamamızın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 hariç) bitti koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

02 Eylül 2021
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

