

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 03.02.2016/10529

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)		
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)		
	Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)		
	Çobandeğneği (<i>Polygonum aviculare</i>)		
	Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)		
	Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)		
Fasulye	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	
	Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>)		
	Sirken (<i>Chenopodium album</i>)		
	Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)		
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i> , <i>F. cilicica</i>)		
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)		
	Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)		
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)		
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
	Soya		Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)
Sütleğen (<i>Euphorbia heterophylla</i>)			
Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)			
Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)			
Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)			
Yonca	Küsküt (<i>Cuscuta spp.</i>)	125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde uygulanır.	
Yer fıstığı	Yapışkan otu (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>E. colonum</i>)		
	Hakiki şahtere (<i>Fumaria officinalis</i>)		
Ayçiçeği (İMİ toleranslı ayçiçeği çeşitleri)	Çukurova fener otu (<i>Physalis angulata</i>)	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.	
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
	Çoban değneği (<i>Polygonum aviculare</i>)		
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		100 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem-ayçiçeği 4-10 yapraklı döneminde uygulanır.
	Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>)		
	Bambul otu (<i>Chrosophora tinctoria</i>)		120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem-ayçiçeği 4-6 yapraklı döneminde uygulanır.
	Sirken (<i>Chenopodium urticum</i>)		
	Köpek üzümü (<i>Solanum album</i>)		130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem – ayçiçeği 6-10 yapraklı döneminde uygulanır.
	Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)		
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)		
Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>)			
Zincir pıtrağı (<i>Xanthium spinosum</i>)			
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)			
Sirken (<i>Chenopodium album</i>)			
Demir dikenli (<i>Tribulus terrestris</i>)			
Semiz otu (<i>Portulaca oleraceae</i>)			
Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)			
Canavar otu - Orabanş (<i>Orobancha cernua</i>)			



AFOROZ® 40 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

40 g/L Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Yutma: Derhal doktor çağırınız. Bir bardak su içirin ve boğazının arka tarafına parmakla dokunarak kusturun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmmez ve kusturulmaz.

Solunum: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunumda güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

®SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

12 Ağustos 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL BÜYÜKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Imazamox
Glikol

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Uygulamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMPLANTASYON VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi ZB Nolu Yol Cd
FNC Tarım İşleri Bölgesi / NİĞDE
Bölge Adresi: 46100 / 061 7865
Telefon No: 07840617865

Rev.1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AFOROZ® 40 SL yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.

IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: **AFOROZ® 40 SL** IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabaş) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

AFOROZ® 40 SL uygulamasından sonra ekilecek bitkiler;

Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı

4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı, nohut, ayçiçeği, tütün

9 ay sonra: Mısır, patates, çeltik, pamuk

12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

DİRENÇ YÖNETİMİ:

AFOROZ® 40 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **AFOROZ® 40 SL'** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.



AFOROZ® 40 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

40 g/L Imazamox

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol
Cad. FNC Tarım Blok No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol
Cad. No:6 Bor/NIĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 315 00 89



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
E ALETLERİ İMALAT PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 2 B Nolu Yol Cd
FNC Tarım Blok No:6 Bor / NIĞDE
Bor V. 0388 999 16 06
Mersis: 0817007840617865

Dr. Nesrin A. ARICAN
Baire Başkanı

12 Ağustos 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Rev.1