

İmal Tarihi:
(Baskı veya damga ile ay yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası:

Nustoria 50 WG; karpuz, pamuk, domates, şeftalide yaprakbiti, patlıcanda beyazsinek mücadelesinde kullanılır.

ETKİ ŞEKLİ: Nustoria 50 WG, yeni bir etki mekanizmasına sahip olup yaprakbitleri ve beyazsineği temas (kontakt) ve sistemik olarak (bitki öz suyuna geçerek) kontrol eder. Ürünün etkili maddesi "pymetrozine" zararlılar tarafından alındığında beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürler.

Nustoria 50 WG, beyazsineklerin hem larvaları hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprakbitleri gibi bu zararlılarında virüs naklini önlemiş olur.

ETKİ SAHASI: Nustoria 50 WG, yaprakbitleri ve beyazsinek zararlılarının hassas ve mukavim türlerine yüksek derecede etkilidir.

KULLANILACAKI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Patlıcan (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	60g/100 l su larva, ergin	5gün
Karpuz	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	25g/da nimf, ergin	7 gün
Pamuk	Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	30 g/da nimf, ergin	35 gün
Domates (Tarla)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	30 g/da nimf, ergin	5 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	20g/100 l su nimf, ergin	21 gün
Domates (Sera)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	100g/ da larva-ergin Damlama sulama ile	5 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TEKNOLOJİ VE İZLENİM BAKANLIĞI
İTİFAH MÜDÜRLÜĞÜ

20 Mart 2018



NUSTORIA 50 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	9	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	---	--------------------------

%50 Pymetrozine

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa ambulans çağırın ve mümkünse suni teneffüs yaptırın. Derhal tıbbi yardım alın.

Deri ile teması halinde: Kirli kıyafetleri çıkarın, bol su ile yıkayın ve kurulaştırın, tahriş oluşursa derhal tıbbi yardım alın.


Göz ile teması halinde: Maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa 1-2 dakika sonra kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Yutulması halinde, en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünün GBF'ni gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hasta baygın değilse ağzını bol miktarda su ile çalkalattırın ve bol miktarda su içirin. Genel durum değerlendirilmezse, belirtilere göre tedavi uygulayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net miktarı: (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Pymetrozine

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H318-Ciddi göz hasarına yol açar

H351-Kansere yol açma şüphesi var.

H412-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P201-Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202-Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.

P264-Elleçlemeden sonra elleri su ve sabun ile iyice yıkayın.

P273-Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280-Kişisel koruyucu ekipman kullanınız.

P501-İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

EUH401-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

-Boş ambalajları ezerek ve toprağa gömerek imha ediniz.

-Yem ve gıda maddelerinin muhafazasında kullanmayınız.

SUNSET KIMYA TARIM ÜRÜNLERİ
SUNSET KIMYA TARIM VE TİC. LTD. STİ.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
11-Şişli/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 294 51 73
Fax: 0212 294 51 73
E-Posta: uzem@sunsetkimya.com.tr

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Patlıcan (sera)-Beyaz sinek: Uygulamalara yaprak başına 4-5 beyaz sinek larvası görüldüğünde başlanır.

Karpuz ve Domates (tarla)-Yaprak biti: Uygulamalara en az 2 nimf veya ergini görüldüğünde başlanır.

Pamuk-Yaprak biti: Uygulama en az 25 yaprak biti nimf veya ergini gözlemlendiğinde yapılmalıdır.

Şeftali- Yaprak biti: Uygulamaya, 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde başlanmalıdır.

Domates (sera-damla sulama)-Beyaz sinek: 5 cm² lik yaprak alanında 6-7 adet beyaz sinek larvası tespit edildiğinde, bitki koruma ürünü damla sulama sistemiyle bitkilerin kök bölgesine verilir. Uygulama öncesi sade sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli bitki koruma ürünü miktarı uygulama tankına konur ve damla sulama sistemi ile uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan ürünün temizlenmesi için uygulama yapılır. Uygulama bittikten sonra da borularda kalan ürünün temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir, baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği kültür bitkisinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas veya yeni çeşitlerde) önce bitki toleransı kontrol edilmelidir.

Entegre Mücadele ve Anti-Resistans Strateji: Sezon başında tespit edilen bir uygulama planına göre uygulanır. Mahalli ekonomik zararlı eşiklerine dikkat edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı ilaçlarla değişim halinde kullanılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Nustoria 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 9 olarak sınıflandırılmış bir insekstistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Nustoria 50 WG'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Nustoria 50 WG, nötr reaksiyonlu insekstisit ve fungusit ile karışım halinde kullanmak isteniyorsa fiziksel karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

28 Mart 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

[Handwritten signature]



NUSTORIA 50 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	9	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	---	--------------------------

%50 Pymetrozine

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜN. VE ALET İML. PAZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Toros Cad. No:11 Sarıçam/ADANA
Tel: 0322 3945171-72 Fax: 0322 3945173

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
ve ALT İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Toros Cad. No:11 Sarıçam/ADANA
Tel: 0322 3945171-72 Fax: 0322 3945173
YÜK. SİG. V.D. 784 028 7284

